


التعداد Dénombrement


I- مبدأ الجداء
تمهيد:

(1) رمي قطعة نقدية:

- (a) إذا رمينا قطعة نقدية فاننا نحصل اما على الوجه F أو على الظهر P . P=pile , F=Face
في هذه الحالة نقول أن لنا امكائيتين .
(b) و إذا رمينا القطعة النقدية مرتين فما هو عدد امكائيات الممكن الحصول عليها :
FF ; FP ; PF ; PP
(c) و إذا رمينا القطعة النقدية ثلاث مرات فما هو عدد الامكائيات الممكن الحصول عليها:
PPP ; PPF ; PFP ; FPP
FFP ; FPF ; PFF ; FFF
يمكن استعمال الشجرة " شجرة الامكائيات " على النحو التالي :



(2) رمي النرد:



- النرد هو مكعب عادة تكون وجوهه الستة مرقمة من 1 الى 6 .
(a) إذا رمينا هذا النرد مرة واحدة و نسجل الرقم المحصل عليه بعد كل رمية فما هي النتائج الممكن المحصل عليها . الجواب : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
لدينا إذا ستة إمكائيات .
(b) إذا قمنا برمي النرد مرتين و كنا نسجل الرقم المحصل عليه بعد كل رمية فما هي مجموعة جميع الامكائيات المتوقعة ؟
الجواب : { (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6) , ... } . يمكن إعطاء جدول للنتائج .
(c) تظنن عدد جميع الإمكائيات إذا قمنا برمي النرد ثلاث مرات متتالية .

(3) تكوين أعداد

- (a) لدينا 6 ببيدقات تحمل الأرقام : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 a_1 ما هو عدد الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام و الممكن تكوينها بواسطة البيدقات .
 a_2 ما هو عدد الأعداد المكونة من ستة أرقام و الممكن تكوينها بواسطة البيدقات .
(b) ما هو عدد الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام .
ملاحظة : لعدد oxy يعتبر عدد مكون من رقمين فقط .

خلاصة : مبدأ الجداء

نعتبر p اختبار

إذا كان : الاختبار الأول يتم بـ n_1 كيفية مختلفة

الاختبار الثاني يتم بـ n_2 كيفية مختلفة

الاختبار p يتم بـ n_p كيفية مختلفة

فإن عدد الكيفيات التي تم بها هذا الاختبار هو : $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$

تطبيقات :

- 1- صندوق يحتوي على 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء
 - (a) نسحب من الصندوق 3 كرات واحدة تلو الأخرى و لا نعيد الكرة المسحوبة إلى الصندوق
 - (a₁) أعط عدد جميع السحبات الممكنة
 - (a₂) أعط عدد السحبات التي تكون فيها جميع الكرات بيضاء.
 - (a₃) أعط عدد السحبات التي تكون فيها جميع الكرات سوداء.
 - (a₄) أعط عدد السحبات التي تكون فيها جميع الكرات لها نفس اللون.
 - (b) نفس الأسئلة علما أننا نعيد الكرة المسحوب إلى الصندوق قبل سحب الأخرى وهكذا.
- 2- كيس يحتوي على 5 ببيدقات تحمل الأرقام 0 - 1 - 2 - 3 - 4 . نسحب ببيدقتين بالتتابع.
 - إذا كانت البيدقة الأولى تحمل رقما فرديا نعيدها إلى الكيس ثم نسحب الثانية
 - و إذا كانت البيدقة الأولى تحمل رقما زوجيا لا نعيدها إلى الكيس ثم نسحب الثانية
 - (a) ما هو عدد جميع الإمكانيات
 - (b) ما هو عدد إمكانيات الحصول على ببيدقتين يحملن رقما فرديا
 - (c) ما هو عدد إمكانيات الحصول على ببيدقتين يحملن رقما زوجي

-II الترتيبات : Les arrangement

تمهيد :

- 1- في قاعة انتظار إحدى العيادات يوجد 10 كراسي و 3 مرضى . بكم من طريقة يمكن للمرضى الثلاث أن يجلسوا.
- 2- أربعة أطفال دخلوا إلى قاعة للمطالعة فوجدوا 5 طاولات. بكم من طريقة يمكن للأطفال أن يجلسوا (كل طاولة لا تسع إلا لطفل على الأكثر)
- 3- قسم يحتوي على 42 تلميذ . بكم من طريقة يمكن اختيار ثلاث تلاميذ واحد تلو الآخر من هذا القسم .

تعريف :

كل ترتيب ل p عنصر من بين n عنصر ($p \leq n$) يسمى ترتيبه ل p عنصر من بين n

عدد الترتيبات :

تمهيد :

مجموعة تتكون من n عنصر .
نريد اختيار p عنصر من بين n بالتتابع
لاختيار العنصر الأول لدينا n طريقة
و لاختيار العنصر الثاني لدينا $(n-1)$ طريقة
و لاختيار العنصر p^{th} لدينا $(n-p+1)$ طريقة.
وحسب مبدأ الجداء لدينا : $n(n-1) \dots (n-p+1)$ طريقة مختلفة لاختيار p عنصر من بين n .

مبرهنة :

عدد الترتيبات ل p عنصر من بين n $p \leq n$ هو $n(n-1) \dots (n-p+1)$ و نرمز له بـ A_n^p

$$A_n^3 = n(n-1) \dots (n-p+1)$$

مثال : A_5^1 , A_6^2 , A_3^3

les permutations : III - التبديلات :

تعريف :

كل ترتيب لـ n عنصر من بين n تسمى تبديلة لـ n عنصر
عدد التبديلات :

عدد التبديلات لـ n عنصر هو العدد A_n^n

$$n(n-1)\dots\times 2\times 1$$

و نرسم له ب: $n!$. و نقرأ n عاملي أو n factoriel .

$$n! = n(n-1)\dots\times 2\times 1$$

اصطلاح : $0! = 1$

$$5! = 120 \quad 63! = \text{مثال}$$

ملاحظة هامة :

$$A_n^p = n(n-1)\dots(n-p+1)$$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)(n-p)!}{(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_n^p = n(n-1)\dots(n-p+1)$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)(n-p)!}{(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Les combinaisons : VI - التاليفات :

تمهيد :

1- نعتبر المجموعة : $E = \{a, b, c, d\}$

جدد جميع أجزاء E

2- نريد اختيار شخصين ثانيا من بين 5 أشخاص
ما هو عدد الطرق لإجراء هذا الاختبار.

تعريف :

لتكن E مجموعة مكونة من n عنصر

كل جزء من E مكون من P عنصر ($p \leq n$) يسمى تاليفة لـ p عنصر من بين n

عدد التاليفات :

لتكن E مجموعة مكونة من n عنصر و ($p \leq n$)

إذا أردنا اختيار p عنصر بالتتابع و بدون إحلال من E فإن عدد جميع الإمكانيات هو A_n^p :

و ليكن N هو عدد التاليفات لـ p عنصر من بين n

نلاحظ أنه بالنسبة للتاليفات الترتيب غير مهم

اذن لكل تاليفة لـ p عنصر من بين n هناك لـ p عنصر من بين n هناك $p!$ ترتيب لـ p عنصر من بين n و منه :

$$N = \frac{A_n^p}{p!} \quad \text{أي} \quad A_n^p = p!N$$

عدد التاليفات ل p عنصر من بين n ($p \leq n$) هو العدد $\frac{A_n^p}{p!}$ و الذي نرسم له ب : C_n^p

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$$

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

تطبيقات:

1- أحسب : C_n^0 , C_n^1 , C_3^1 , C_4^2

2- بين أن : $C_n^{n-p} = C_n^p$

3- بين أن : $C_n^{p-1} + C_n^p = C_{n+1}^p$, $1 \leq p \leq n$

4- مثلث باسكال

5- صيغة الجذائبة : $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$

أمثلة : (1) أحسب : $(n+1)^5$

(2) بين أن : $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$

استنتج عدد أجزاء مجموعة تحتوي على n عنصر

خاصية : عدد أجزاء مجموعة تحتوي على n عنصر هو 2^n

$$cardP(E) = 2^{cardE}$$